

服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう、大切に保管して下さい。

(非ピリン系解熱鎮痛薬)

頭痛専門薬 快[®]

®登録商標

この医薬品はづつうの専門薬としてつくられています。優れた鎮痛解熱薬のアセトアミノフェン、エテンザミドに、へん頭痛や頭重に効く中枢興奮剤の無水カフェインを合理的に配合してありますのでづつうの鎮痛に早く良い効果を示します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こした事がある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用後は飲酒しないこと。
- 長期連用しないこと。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

裏面もお読み下さい

まれに下記の重篤な症状がおきることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる等）があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

頭痛の鎮痛

〔用法・用量〕

次の量をなるべく空腹時をさけて服用する。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上	1 包	2 回
11才以上15才未満	2/3 包	2 回
8 才以上11才未満	1/2 包	2 回
5 才以上 8 才未満	1/3 包	2 回
3 才以上 5 才未満	1/4 包	2 回

いずれも1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。

なお服用間隔は6時間以上おくこと。

- 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないこと。

〔成分・分量〕

2包（成人の1日服用量）中

はたらき	成 分	含 量
いたみをやわらげる・熱を下げる	エテンザミド	6 0 0 mg
いたみをやわらげる・熱を下げる	アセトアミノフェン	6 0 0 mg
へん頭痛や、頭重に効く	無水カフェイン	2 0 0 mg

添加物：バレシヨデンプン、リン酸水素カルシウム

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

■お問い合わせ先

天真堂製薬株式会社 お客様相談室
奈良県高市郡明日香村越495の1
電話 0744(54)3088(代表)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

天真堂製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村越495の1