

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管して下さい。

非ピリン系総合感冒薬

新 マユミン

「かぜは万病のもと」はやくなおしましょう。この白い錠剤は優れた解熱鎮痛剤・気管支拡張剤・鎮咳剤・抗ヒスタミン剤及び中枢興奮剤等を合理的に配合した総合感冒薬です。かぜの諸症状に早く良い効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等）
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があられることがある。)
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

🗣 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

裏面もお読み下さい

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすみ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイvens・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

〔用法・用量〕

次の量を食後約30分以内に、水又はお湯と一緒に服用すること。

年 令	成人(15才以上)	11才以上15才未満	7才以上11才未満
一 回 量	3錠	2錠	1錠
一日服用回数	3回	3回	3回

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕

9錠(成人の1日服用量)中に次の成分を含んでいます。

はたらき	成 分	含 量
いたみをやわらげる・熱を下げる	アセトアミノフェン	900mg
気管支を拡張しせきやたんを鎮める	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
せきやたんを鎮める	ノスカピン	48mg
くしゃみ、鼻水、鼻づまりに効く	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
頭重やへん頭痛に	無水カフェイン	75mg

添加物：バレイショデンプン、乳糖、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

■お問い合わせ先

製造販売元 天真堂製薬株式会社 お客様相談室

奈良県高市郡明日香村越495の1
電話 0744(54)3088(代表)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931